

Dénomination du médicament

**CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose**  
**Digluconate de chlorhexidine**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ?
3. Comment utiliser CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QUE CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique : antiseptiques - code ATC : D08AC02

Ce médicament est un antiseptique (il lutte contre la prolifération de microbes).

Ce médicament est préconisé dans l'antiseptie des petites plaies (superficielles et peu étendues).

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ?**

**N'utilisez jamais CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose :**

- si vous êtes allergique à la chlorhexidine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles, sur les muqueuses (nez, gorge, muqueuses génitales).

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant d'utiliser CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05%, solution pour application locale en récipient unidose.

Ce médicament est réservé à l'usage externe.

CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL ne doit pas entrer en contact avec l'œil en raison du risque de lésions visuelles. S'il entre en contact avec les yeux, rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. En cas d'irritation, de rougeur ou de douleur oculaire, ou de troubles visuels, demandez rapidement conseil à un médecin.

Des cas graves de lésion cornéenne persistante (lésion à la surface de l'œil) pouvant nécessiter une greffe cornéenne ont été rapportés lorsque des produits similaires sont accidentellement entrés en contact avec l'œil au cours d'interventions chirurgicales, chez des patients sous anesthésie générale (sommeil sans douleur intense).

Il ne doit pas être utilisé pour l'antiseptie des zones de ponctions ou d'injections, ni pour la désinfection du petit matériel chirurgical.

Il ne doit pas être utilisé en cas de plaies profondes et étendues sans avis médical.

### **Enfants**

Ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 30 mois sans avis médical.

Utiliser avec précaution chez les nouveau-nés, particulièrement les prématurés.

CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL peut provoquer des brûlures chimiques cutanées.

### **Autres médicaments et CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

Ce médicament ne doit pas être utilisé en même temps que d'autres antiseptiques locaux ou agents nettoyants (risque d'incompatibilité et d'inefficacité du produit).

### **CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse, allaitement et fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose contient**

Sans objet.

## **3. COMMENT UTILISER CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Cette solution est prête à l'emploi. CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL peut être appliqué directement sur les plaies.

Ne pas rincer.

USAGE EXTERNE EXCLUSIVEMENT.

NE PAS INJECTER - NE PAS AVALER.

### **Mode d'administration**

VOIE CUTANÉE.

### **Fréquence d'administration**

2 applications par jour.

### **Si vous avez utilisé plus de CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose que vous n'auriez dû**

En cas d'ingestion orale, prendre l'avis d'un centre antipoison.

### **Si vous oubliez d'utiliser CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose**

Sans objet.

### **Si vous arrêtez d'utiliser CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Possibilité de réaction allergique (eczéma, éruption cutanée).
- Brûlures chimiques chez le nouveau-né.
- Lésion cornéenne (lésion à la surface de l'œil) et lésion oculaire permanente, y compris déficience visuelle permanente (à la suite d'une exposition oculaire accidentelle lors d'interventions chirurgicales sur la tête, le visage et le cou) chez des patients sous anesthésie générale (sommeil sans douleur intense) (fréquence indéterminée).

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## **5. COMMENT CONSERVER Chlorhexidine Arrow conseil 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

### **Ce que contient CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose**

- La substance active est :

Digluconate de chlorhexidine..... 50 mg

(sous forme de solution de digluconate de chlorhexidine à 20 pour cent)

Pour 100 mL de solution

- Les autres composants sont : Nonoxinol 9, eau purifiée.

### **Qu'est-ce que CHLORHEXIDINE ARROW CONSEIL 0,05 %, solution pour application locale en récipient unidose et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme d'une solution stérile pour application locale en récipient unidosé de 10 mL et 15 mL, boîtes de 5, 10, 15, 16, 24, 30, 40 ou 100.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

**Fabricant**

**LABORATOIRE UNITHER**

ESPACE INDUSTRIEL NORD

151 RUE ANDRE DUROUCHEZ

CS 28028

80084 AMIENS CEDEX 2

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).