

**Dénomination du médicament**

**DAILY, comprimé enrobé**  
**Lévonorgestrel / Ethinylestradiol**

**Points importants à connaître concernant les contraceptifs hormonaux combinés (CHC) :**

- Ils comptent parmi les méthodes de contraception réversibles les plus fiables lorsqu'ils sont utilisés correctement.
- Ils augmentent légèrement le risque de formation d'un caillot sanguin dans les veines et les artères, en particulier pendant la première année de leur utilisation ou lorsque le contraceptif hormonal combiné est repris après une interruption de 4 semaines ou plus.
- Soyez vigilante et consultez votre médecin si vous pensez présenter les symptômes évocateurs d'un caillot sanguin (voir rubrique 2 « Caillots sanguins »).

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que DAILY, comprimé enrobé et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre DAILY, comprimé enrobé ?
3. Comment prendre DAILY, comprimé enrobé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver DAILY, comprimé enrobé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE DAILY, comprimé enrobé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : PROGESTATIFS ET ESTROGENES POUR ADMINISTRATION SEQUENTIELLE - code ATC : G03AB03

DAILY, comprimé enrobé est un contraceptif hormonal oral utilisé afin d'éviter une grossesse.

Chaque comprimé de DAILY, comprimé enrobé contient deux hormones féminines différentes en petite quantité : le lévonorgestrel et l'éthinylestradiol.

Les contraceptifs oraux contenant deux hormones sont appelés contraceptifs hormonaux « combinés ».

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE DAILY, comprimé enrobé ?

### Informations générales

Avant de commencer un traitement par DAILY un interrogatoire sur vos antécédents médicaux et ceux de vos proches sera effectué par votre médecin. Votre pression artérielle sera mesurée et, si nécessaire, selon votre situation personnelle, d'autres examens pourront être demandés.

Avant de commencer à prendre DAILY, vous devez lire les informations concernant les caillots sanguins (thrombose) en rubrique 2. Il est particulièrement important de lire la description des symptômes d'un caillot sanguin (voir rubrique 2 « Caillots sanguins »).

Cette notice indique les situations dans lesquelles vous devez arrêter de prendre DAILY, comprimé enrobé ou les circonstances dans lesquelles l'efficacité contraceptive peut être diminuée. Dans ces cas, vous ne devez pas avoir de rapports sexuels ou alors, vous devez utiliser d'autres méthodes contraceptives non hormonales comme le préservatif ou toute autre barrière mécanique. N'utilisez pas de méthodes naturelles de contraception (mesure de la température, aspect de la glaire cervicale). En effet, ces méthodes peuvent ne pas être fiables car DAILY, comprimé enrobé a un effet sur la température corporelle et sur la glaire cervicale.

**Comme les autres contraceptifs oraux, DAILY, comprimé enrobé ne protège pas contre l'infection par le VIH (SIDA) ni contre les autres maladies sexuellement transmissibles (MST).**

### Ne prenez jamais DAILY, comprimé enrobé :

Vous ne devez pas prendre DAILY si vous êtes dans l'une des situations listées ci-dessous. Si tel est le cas, vous devez en informer votre médecin. Votre médecin discutera avec vous d'autres méthodes de contraception qui seraient plus adaptées.

- Si vous avez (ou avez déjà eu) un caillot dans un vaisseau sanguin d'une jambe (thrombose veineuse profonde (TVP)), du poumon (embolie pulmonaire (EP)) ou d'autres organes ;
- si vous vous savez atteinte d'un trouble affectant la coagulation sanguine – par exemple, un déficit en protéine C, une résistance à la protéine C activée (PCa, une mutation du facteur V de Leiden), un déficit en protéine S, un déficit en antithrombine III ou la présence d'anticorps anti-phospholipides ;
- si vous devez être opérée ou si vous êtes alitée pendant une durée prolongée (voir la rubrique « Caillots sanguins ») ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (AVC) ;
- si vous avez (ou avez déjà eu) une angine de poitrine (une maladie provoquant des douleurs intenses dans la poitrine et pouvant être le signe précurseur d'une crise cardiaque)

ou un accident ischémique transitoire (AIT – symptômes temporaires d’AVC) ;

• si vous avez l'une des maladies suivantes pouvant augmenter le risque de caillot dans les artères:

○ diabète, avec atteinte des vaisseaux sanguins ;

○ pression artérielle très élevée ;

○ taux très élevé des graisses dans le sang (cholestérol ou triglycérides) ;

○ maladie appelée hyperhomocystéinémie ;

○ troubles du rythme cardiaque ;

○ maladie des valves cardiaques ;

• si vous avez (ou avez déjà eu) un type de migraine appelé migraines avec aura c'est-à-dire avec des symptômes précédant le mal de tête proprement dit ;

• si vous avez ou avez eu une inflammation du pancréas (pancréatite) ;

• si vous avez ou avez eu une affection du foie avec absence de normalisation de votre fonction hépatique ;

• si vous avez ou vous avez eu une tumeur du foie ;

• si vous avez, ou avez eu, ou êtes suspectée d’avoir un cancer du sein ou des organes génitaux ;

• si vous avez des saignements vaginaux inexpliqués ;

• si vous êtes allergique à l'éthinylestradiol ou au lévonorgestrel, ou à l'un des composants de DAILY. Ceci peut se manifester par des démangeaisons, une éruption cutanée ou un gonflement ;

• en association avec du millepertuis (voir aussi rubrique « Autres médicaments et DAILY, comprimé enrobé ») ;

• en association avec le fostemsavir (un médicament indiqué dans le traitement des infections par le VIH) (voir aussi rubrique « Autres médicaments et DAILY, comprimé enrobé ») ;

• N'utilisez pas DAILY si vous souffrez d'hépatite C et que vous prenez des médicaments contenant l'association ombitasvir/paritaprévir/ritonavir, dasabuvir, glécaprèvir/pibrentasvir ou sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprèvir (voir aussi rubrique « Autres médicaments et DAILY, comprimé enrobé »).

## **Avertissements et précautions**

### **Dans quels cas devez-vous faire attention avec DAILY, comprimé enrobé ?**

Dans quels cas devez-vous contacter votre médecin ?

## Consultez un médecin de toute urgence

- si vous remarquez de possibles signes d'un caillot sanguin, qui pourraient indiquer que vous avez un caillot sanguin dans une jambe (thrombose veineuse profonde), que vous avez un caillot sanguin dans un poumon (embolie pulmonaire) ou que vous faites une crise cardiaque ou un AVC (voir la rubrique « Caillots sanguins » ci-dessous).

Pour la description des symptômes de ces effets indésirables graves, reportez-vous à la rubrique « Comment reconnaître un caillot sanguin ».

### **Si vous êtes dans l'une des situations suivantes, informez-en votre médecin.**

Si le problème apparaît ou s'aggrave pendant l'utilisation de DAILY, vous devez également en informer votre médecin.

- En cas de survenue ou antécédent de cancer du sein chez un parent proche ;
- si vous avez une affection du foie ou de la vésicule biliaire ;
- si vous êtes diabétique ;
- en cas de dépression ;
- si vous êtes atteinte de la maladie de Crohn ou de recto-colite hémorragique (maladies inflammatoires chroniques de l'intestin) ;
- si vous avez un lupus érythémateux disséminé (LED) (une maladie qui affecte votre système de défenses naturelles) ;
- si vous avez un syndrome hémolytique et urémique (SHU) (un trouble de la coagulation sanguine qui entraîne une défaillance des reins) ;
- si vous avez une drépanocytose (une maladie héréditaire touchant les globules rouges) ;
- si vous avez des taux élevés de graisses dans le sang (hypertriglycémie) ou des antécédents familiaux de ce trouble. L'hypertriglycémie a été associée à une augmentation du risque de pancréatite (inflammation du pancréas) ;
- si vous devez être opérée ou si vous êtes alitée pendant une durée prolongée (reportez-vous à la rubrique 2, « Caillots sanguins ») ;
- si vous venez juste d'accoucher, vous êtes exposée à un risque augmenté de caillots sanguins. Vous devez demander à votre médecin combien de temps après l'accouchement vous pouvez commencer à prendre DAILY ;
- si vous avez une inflammation des veines situées sous la peau (thrombophlébite superficielle) ;
- si vous avez des varices.

- si vous êtes épileptique (voir rubrique « Autres médicaments et DAILY, comprimé enrobé ») ;
- si vous avez une augmentation de la prolactine ;
- si vous avez présenté l'une des pathologies suivantes lors d'une grossesse ou la prise antérieure d'un traitement hormonal : perte auditive, maladie du sang appelée porphyrie, herpès de la grossesse (éruption de vésicules sur la peau pendant la grossesse), chorée de Sydenham (maladie des nerfs avec survenue de mouvements corporels brusques non contrôlés) ;
- en cas d'antécédent ou de survenue de chloasma (tâches brun doré en particulier sur le visage, appelées « masque de grossesse »). Dans ce cas, évitez toute exposition directe au soleil ou aux rayons ultraviolets ;
- Si vous développez des symptômes d'angioœdème, tels qu'un gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire avec éventuellement des difficultés à respirer, consultez immédiatement votre médecin. Les produits contenant des œstrogènes peuvent déclencher ou aggraver les symptômes d'un angioœdème héréditaire ou acquis.

## **CAILLOTS SANGUINS**

**L'utilisation d'un contraceptif hormonal combiné, tel que DAILY, augmente le risque d'apparition d'un caillot sanguin en comparaison à une non-utilisation. Dans de rares cas, un caillot sanguin peut bloquer des vaisseaux sanguins et provoquer de graves problèmes**

Les caillots sanguins peuvent se former :

- dans les veines (on parle alors de « thrombose veineuse » ou de « thrombo-embolie veineuse » [TEV]) ;
- dans les artères (on parle alors de « thrombose artérielle » ou de « thrombo-embolie artérielle » [TEA]).

Le rétablissement, suite à des caillots sanguins, n'est pas toujours complet. Dans de rares cas, ils peuvent entraîner des séquelles graves et durables et, dans de très rares cas, ils peuvent être fatals.

**Il est important de garder à l'esprit que le risque global de caillot sanguin dû à DAILY est faible.**

### **COMMENT RECONNAÎTRE UN CAILLOT SANGUIN**

Consultez un médecin de toute urgence si vous remarquez l'un des signes ou symptômes suivants.

**Présentez-vous l'un de ces signes ?**

**Il peut éventuellement s'agir de :**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• gonflement d'une jambe ou le long d'une veine de la jambe et/ou du pied, en particulier s'il s'accompagne de : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ douleur ou sensibilité dans la jambe, pouvant n'être ressentie qu'en position debout ou lors de la marche</li> <li>◦ sensation de chaleur dans la zone atteinte</li> <li>◦ changement de couleur de la zone atteinte, devenant p. ex. bleutée ou rougeâtre</li> </ul> </li>   <li>• douleur abdominale intense et soudaine (dans le cas d'une atteinte abdominale).</li> </ul>	<p>Thrombose veineuse profonde</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• apparition soudaine et inexplicquée d'un essoufflement ou d'une respiration rapide</li>   <li>• toux soudaine sans cause apparente, avec parfois des crachats de sang</li>   <li>• douleur aiguë dans la poitrine</li>   <li>• étourdissements ou sensations vertigineuses sévères</li>   <li>• battements de cœur rapides ou irréguliers</li>   <li>• douleur abdominale intense et soudaine</li> </ul> <p>En cas de doute, consultez un médecin car certains de ces symptômes, comme la toux ou l'essoufflement, peuvent être pris à tort pour les signes d'une maladie moins sévère telle qu'une infection respiratoire (p.ex. un simple rhume).</p>	<p>Embolie pulmonaire</p>
<p>Symptômes apparaissant le plus souvent dans un seul œil :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• perte immédiate de la vision ou</li>   <li>• vision trouble sans douleur pouvant évoluer vers une perte de la vision</li> </ul>	<p>Thrombose veineuse rétinienne (caillot sanguin dans l'œil)</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• douleur, gêne, pression, lourdeur dans la poitrine irradiant vers le dos, la mâchoire, la gorge, le bras et l'estomac ;</li> <li>• sensation d'oppression ou d'encombrement dans la poitrine, le bras ou sous le sternum ;</li> <li>• sensation d'encombrement, d'indigestion ou de suffocation ;</li> <li>• transpiration, nausées, vomissements ou sensations vertigineuses ;</li> <li>• faiblesse, anxiété ou essoufflement extrêmes ;</li> <li>• battements de cœur rapides ou irréguliers.</li> </ul>	<p>Crise cardiaque</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• apparition soudaine d'une faiblesse ou d'un engourdissement au niveau du visage, d'un bras ou d'une jambe, en particulier d'un côté du corps ;</li> <li>• apparition soudaine d'une confusion, de difficultés à parler ou à comprendre ;</li> <li>• apparition soudaine de difficultés à voir d'un œil ou des deux yeux ;</li> <li>• apparition soudaine de difficultés à marcher, de sensations vertigineuses, d'une perte d'équilibre ou de coordination ;</li> <li>• maux de tête soudains, sévères ou prolongés, sans cause connue ;</li> <li>• perte de conscience ou évanouissement avec ou sans crise convulsive.</li> </ul> <p>Parfois, les symptômes de l'AVC peuvent être de courte durée, avec un rétablissement presque immédiat et complet, mais vous devez tout de même consulter un médecin de toute urgence car vous pourriez être exposée au risque d'un nouvel AVC.</p>	<p>Accident vasculaire cérébral (AVC)</p>

## **CAILLOTS SANGUINS DANS UNE VEINE**

**Que peut-il se passer si un caillot sanguin se forme dans une veine ?**

- Un lien a été établi entre l'utilisation de contraceptifs hormonaux combinés et l'augmentation du risque de caillots sanguins dans les veines (thrombose veineuse). Cependant, ces effets indésirables sont rares. Le plus souvent, ils surviennent pendant la première année d'utilisation d'un contraceptif hormonal combiné.
- Lorsqu'un caillot sanguin se forme dans une veine d'une jambe ou d'un pied, il peut provoquer une thrombose veineuse profonde (TVP).
- Si le caillot sanguin migre de la jambe vers le poumon, il peut provoquer une embolie pulmonaire.
- Dans de très rares cas, un caillot peut se former dans une veine d'un autre organe, comme l'œil (thrombose veineuse rétinienne) ou dans une autre partie du corps comme le bras ou l'abdomen.

### **À quel moment le risque d'apparition d'un caillot sanguin dans une veine est-il le plus élevé ?**

Le risque d'apparition d'un caillot sanguin dans une veine est maximal pendant la première année d'utilisation d'un contraceptif hormonal combiné pris pour la première fois. Le risque peut également être augmenté lorsque vous recommencez à prendre un contraceptif hormonal combiné (le même produit ou un produit différent) après une interruption de 4 semaines ou plus. Après la première année, le risque diminue mais reste toujours légèrement plus élevé que si vous n'utilisiez pas de contraceptif hormonal combiné.

Lorsque vous arrêtez de prendre DAILY, le risque d'apparition de caillot sanguin revient à la normale en quelques semaines.

### **Quel est le risque d'apparition d'un caillot sanguin ?**

Le risque dépend de votre risque de base de TEV et du type de contraceptif hormonal combiné que vous prenez.

Le risque global de caillot sanguin dans une jambe ou un poumon (TVP ou EP) associé à DAILY est faible.

- Sur 10 000 femmes qui n'utilisent aucun contraceptif hormonal combiné et qui ne sont pas enceintes, environ 2 développeront un caillot sanguin sur une période d'un an.
- Sur 10 000 femmes qui utilisent un contraceptif hormonal combiné contenant du lévonorgestrel comme DAILY, environ 5 à 7 développeront un caillot sanguin sur une période d'un an.
- Le risque d'apparition d'un caillot sanguin variera selon vos antécédents médicaux personnels (voir « Facteurs augmentant le risque de caillot sanguin dans une veine » ci-dessous).

<p>Risque d'apparition d'un caillot sanguin sur une période d'un an</p>
---

Femmes qui <b>n'utilisent pas</b> de contraceptif hormonal combiné (pilule/patch/anneau) et qui ne sont pas enceintes	Environ 2 femmes sur 10 000
Femmes qui utilisent une pilule contraceptive hormonale combinée contenant du <b>lévonorgestrel comme DAILY</b>	Environ 5 à 7 femmes sur 10 000

### **Facteurs augmentant le risque de caillot sanguin dans une veine**

Le risque de caillot sanguin associé à DAILY est faible mais certaines situations peuvent augmenter ce risque. Le risque sera plus élevé :

- si vous avez un surpoids important (indice de masse corporelle [IMC] supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup>) ;
- si l'un des membres de votre famille proche a eu un caillot sanguin dans une jambe, un poumon ou un autre organe à un âge relativement jeune (p. ex. avant l'âge de 50 ans). Si tel est le cas, vous pourriez être atteinte d'un trouble héréditaire de la coagulation sanguine ;
- si vous devez être opérée ou si vous êtes alitée pendant une période prolongée en raison d'une blessure ou d'une maladie, ou si l'une de vos jambes est immobilisée (p. ex. plâtre). Il pourra être nécessaire d'interrompre l'utilisation de DAILY plusieurs semaines avant l'opération chirurgicale et/ou tant que votre mobilité est réduite. Si vous devez arrêter de prendre DAILY, demandez à votre médecin à quel moment vous pourrez recommencer à l'utiliser.
- avec l'âge (en particulier au-delà de 35 ans) ;
- si vous avez accouché dans les 6 semaines précédentes.
- si vous êtes atteinte par l'une de ces pathologies : cancer, lupus érythémateux disséminé, syndrome hémolytique et urémique, maladies inflammatoires chroniques intestinales et drépanocytose.

Plus vous cumulez ces situations, plus le risque d'apparition d'un caillot sanguin augmente.

Les voyages en avion (de plus de 4 heures) peuvent augmenter temporairement le risque de caillot sanguin, en particulier si vous présentez déjà certains des autres facteurs listés.

Il est important de prévenir votre médecin si vous êtes concernée par l'une de ces situations, même si vous n'en êtes pas certaine. Votre médecin pourra décider qu'il est nécessaire d'arrêter le traitement par DAILY.

Si l'une des situations ci-dessus évolue pendant la période où vous utilisez DAILY, par exemple si un membre de votre famille proche développe une thrombose sans raison connue ou si vous prenez beaucoup de poids, parlez-en à votre médecin.

### **CAILLOTS SANGUINS DANS UNE ARTÈRE**

#### **Que peut-il se passer si un caillot sanguin se forme dans une artère ?**

Comme un caillot sanguin dans une veine, un caillot dans une artère peut provoquer de graves problèmes. Par exemple, il peut provoquer une crise cardiaque ou un accident vasculaire

cérébral (AVC).

### **Facteurs augmentant le risque de caillot sanguin dans une artère**

Il est important de noter que le risque de crise cardiaque ou d'AVC lié à l'utilisation de DAILY est très faible mais peut augmenter :

- avec l'âge (au-delà de 35 ans) ;
- si vous fumez. Lors de l'utilisation d'un contraceptif hormonal combiné tel que DAILY, il est conseillé d'arrêter de fumer. Si vous ne parvenez pas à arrêter de fumer et si vous êtes âgée de plus de 35 ans, votre médecin pourra vous conseiller d'utiliser une méthode de contraception différente.
- si vous avez un surpoids important (indice de masse corporelle [IMC] supérieur à 30 kg/m<sup>2</sup>) ;
- si vous avez une pression artérielle élevée ;
- si vous êtes atteint d'une hyperhomocystéinémie (augmentation de l'acide aminé homocystéine dans le sang), d'une dyslipoprotéïnémie (augmentation des graisses dans le sang (lipides et lipoprotéines)) ou d'un lupus érythémateux disséminé ; si un membre de votre famille proche a déjà eu une crise cardiaque ou un AVC à un âge relativement jeune (avant l'âge de 50 ans). Si tel est le cas, le risque que vous ayez une crise cardiaque ou un AVC pourrait également être élevé ;
- si vous ou un membre de votre famille proche avez un taux de graisses élevés dans le sang (cholestérol ou triglycérides) ;
- si vous avez des migraines, en particulier des migraines avec aura ;
- si vous avez des problèmes cardiaques (maladie de la valve cardiaque, trouble du rythme appelé fibrillation auriculaire) ;
- si vous êtes diabétique

Si vous cumulez plusieurs de ces situations ou si l'une d'entre elles est particulièrement sévère, le risque d'apparition d'un caillot sanguin peut être encore plus élevé.

Si l'une des situations ci-dessus évolue pendant la période où vous utilisez DAILY, par exemple si vous commencez à fumer, si un membre de votre famille proche développe une thrombose sans raison connue ou si vous prenez beaucoup de poids, parlez-en à votre médecin.

### **DAILY et CANCER**

Le cancer du sein est plus fréquent chez les femmes qui prennent un contraceptif oral sans que l'on sache si ce traitement en est la cause. En effet, il est possible que les femmes prenant un contraceptif oral soient examinées plus souvent par leur médecin attentivement. Cette différence disparaît progressivement après l'arrêt du contraceptif oral.

Il est important d'examiner régulièrement vos seins. En cas de survenue d'une grosseur suspecte, contactez votre médecin.

Dans de rares cas, des tumeurs bénignes du foie, et plus rarement encore des tumeurs malignes du foie ont été observées chez des femmes prenant un contraceptif oral. Consultez votre médecin si vous présentez subitement des maux de ventre intenses.

### **Saignements entre les règles**

Des saignements entre les règles, en dehors de la semaine d'interruption, peuvent survenir dans les premiers mois d'un traitement par DAILY. Si ces saignements persistent plusieurs mois ou s'ils apparaissent au bout de plusieurs mois d'utilisation, votre médecin doit en rechercher la cause.

### **Que devez-vous faire si vos règles ne surviennent pas pendant la période d'arrêt entre deux plaquettes ?**

Si vous avez pris correctement tous les comprimés, si vous n'avez pas eu de vomissements ou de diarrhées sévères et si vous n'avez pas pris d'autres médicaments, il est peu probable que vous soyez enceinte.

Si vous avez pris correctement tous les comprimés sur une période de deux mois et que vous n'avez pas vos règles, il se peut que vous soyez enceinte. Consultez immédiatement votre médecin. Ne commencez pas la plaquette suivante tant que vous n'êtes pas certaine de ne pas être enceinte.

### **Troubles psychiatriques**

Certaines femmes qui utilisent des contraceptifs hormonaux dont DAILY ont fait état d'une dépression ou d'un état dépressif. La dépression peut être grave et peut parfois donner lieu à des idées suicidaires. Si vous présentez des changements d'humeur et des symptômes dépressifs, sollicitez les conseils de votre médecin dès que possible.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et DAILY, comprimé enrobé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament ou préparations à base de plantes.

Indiquez également à tout autre médecin ou dentiste qui vous prescrira un autre médicament (ou à votre pharmacien) que vous utilisez DAILY. Il vous indiquera si vous devez prendre des mesures contraceptives complémentaires (par exemple, préservatifs) et si nécessaire, pendant quelle durée.

Certains médicaments peuvent diminuer la capacité de DAILY à prévenir une grossesse ou peuvent entraîner des saignements inattendus. D'autres médicaments sont susceptibles d'augmenter les concentrations sanguines de l'estrogène (éthinyloestradiol) contenu dans DAILY.

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE :

- en association avec le millepertuis (voir rubrique « Ne prenez jamais DAILY, comprimé enrobé »),
- si vous souffrez d'hépatite C et que vous prenez des médicaments contenant les associations suivantes : ombitasvir/paritaprèvir/ritonavir, dasabuvir ± ribavirine, glécaprèvir/pibrentasvir ou sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprèvir, car ces produits pourraient entraîner des élévations aux tests sanguins de la fonction hépatique (élévation de l'enzyme

hépatique ALAT). Votre médecin vous prescrira un autre type de contraception avant de démarrer le traitement par ces médicaments. DAILY peut être repris 2 semaines environ après la fin de ce traitement. Voir rubrique « Ne prenez jamais DAILY, comprimé enrobé ».

- en association avec le fostemsavir (un médicament indiqué dans le traitement des infections par le VIH), car ce produit pourrait augmenter les concentrations sanguines de l'estrogène (éthinyloestradiol) et augmenter les risques de complications thromboemboliques (reportez-vous aux rubriques « Caillots sanguins » et « Ne prenez jamais DAILY, comprimé enrobé »).

Ce médicament DOIT ETRE EVITE en association avec certains médicaments utilisés dans le traitement de(s) :

- l'épilepsie (ex : primidone, phénytoïne, fosphénytoïne, phénobarbital, carbamazépine, oxcarbazépine, topiramate, rufinamide, pérampandol, esclicarbazépine, felbamate) ;
- la tuberculose (ex : rifampicine, rifabutine) ;
- infections par le VIH (ex : ritonavir, névirapine, éfavirenz, elvitégravir, atazanavir, darunavir, fosamprénavir, lopinavir, saquinavir, tipranavir), le cytomégalovirus (létermovir) ou autres infections (griséofulvine) ;
- l'hypertension artérielle pulmonaire (bosentan) ;
- la narcolepsie (modafinil, pitolisant) ;
- des nausées et vomissements causés par les chimiothérapies (aprépitant) ;
- certains types de cancers (vémurafénib, dabrafénib, enzalutamide, apalutamide, lorlatinib) ;
- la mucoviscidose (lumacaftor) ;
- le fibrome et l'indication de la contraception d'urgence (ulipristal).

DAILY peut agir sur l'efficacité d'un autre médicament :

- un antiépileptique : la lamotrigine (cela peut augmenter la fréquence des crises d'épilepsie).

Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Examens biologiques**

Si vous devez effectuer un examen sanguin, informez votre médecin ou l'équipe du laboratoire que vous prenez une contraception orale, ce produit pouvant modifier les résultats de certains examens.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **DAILY, comprimé enrobé avec des aliments et boissons**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

En cas de grossesse, ce médicament n'a pas lieu de vous être prescrit. Dans ce cas, arrêtez le traitement, prévenez et consultez votre médecin afin de vous conformer à ses recommandations. En cas d'allaitement, l'utilisation de DAILY est en général déconseillée. Consultez votre médecin si vous désirez prendre un contraceptif oral pendant l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Il n'y a pas de données suggérant que DAILY affecte la conduite ou l'utilisation des machines.

### **DAILY, comprimé enrobé contient du saccharose et du lactose.**

Si votre médecin vous a informée d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

### **3. COMMENT PRENDRE DAILY, comprimé enrobé ?**

Prenez un comprimé de DAILY, comprimé enrobé tous les jours, si nécessaire avec un peu d'eau. Vous pouvez prendre les comprimés avec ou sans nourriture, mais prenez toujours les comprimés à la même heure de la journée.

La plaquette contient 21 comprimés. Prenez les 21 comprimés dans l'ordre suivant :

- 1 comprimé rose par jour pendant 6 jours consécutifs puis
- 1 comprimé blanc par jour pendant 5 jours consécutifs puis
- 1 comprimé jaune par jour pendant 10 jours consécutifs avec un arrêt de 7 jours entre deux plaquettes.

Une hémorragie de privation doit apparaître pendant l'intervalle sans comprimés (cette période est également appelée semaine d'arrêt ou d'interruption), généralement le 2<sup>ème</sup> ou le 3<sup>ème</sup> jour après la prise du dernier comprimé.

Commencez la plaquette suivante dès le 8<sup>ème</sup> jour après le jour de prise du dernier comprimé (c'est-à-dire après l'arrêt pendant les 7 jours), même si l'hémorragie de privation persiste.

Ceci signifie que vous devez toujours commencer la plaquette suivante le même jour de la semaine et avoir une hémorragie de privation les mêmes jours tous les mois.

Si vous utilisez DAILY, comprimé enrobé de cette façon, vous êtes protégée d'une grossesse même pendant les 7 jours sans prise de comprimés.

### **Quand commencer la première plaquette :**

- **Si vous n'avez pas pris de contraception hormonale au cours du mois précédent :**

Commencez DAILY, comprimé enrobé le premier jour du cycle (c'est-à-dire le premier jour de vos règles). En commençant DAILY, comprimé enrobé le premier jour de vos règles, vous êtes immédiatement protégée d'une grossesse.

- **Si vous preniez un autre contraceptif hormonal combiné (contraceptif oral combiné, anneau vaginal, dispositif transdermique (patch)) :**

Commencez DAILY, comprimé enrobé de préférence le jour suivant la prise du dernier comprimé actif (le dernier comprimé contenant les substances actives) du contraceptif oral

combiné précédent ou au plus tard le jour suivant la période habituelle d'arrêt des comprimés (ou après la prise du dernier comprimé inactif du contraceptif oral combiné précédent).

Dans le cas de l'anneau vaginal ou du dispositif transdermique, prendre le 1<sup>er</sup> comprimé le jour de retrait ou au plus tard le jour prévu pour l'application du nouveau dispositif ou du nouvel anneau. Suivez l'avis de votre médecin.

**• Si vous utilisiez une méthode contraceptive contenant un progestatif seul (pilule microdosée, forme injectable, implant ou dispositif intra-utérin (DIU ou stérilet) délivrant un progestatif) :**

- o en relais d'une pilule progestative : vous pouvez commencer DAILY, comprimé enrobé, à tout moment du cycle, le lendemain de l'arrêt de la pilule ;
- o en relais d'un implant ou d'un système intra-utérin : débutez DAILY, comprimé enrobé le jour du retrait ;
- o en relais d'un contraceptif injectable : débutez DAILY, comprimé enrobé le jour prévu pour la nouvelle injection.

Dans tous les cas, quelle que soit la méthode précédente, vous devez utiliser des précautions complémentaires (par exemple, un préservatif) pendant les 7 premiers jours de prise de DAILY, comprimé enrobé.

**• Si vous débutez DAILY, comprimé enrobé après une interruption de grossesse du premier trimestre, vous pouvez débiter immédiatement.**

**• Après un accouchement ou une interruption de grossesse du deuxième trimestre :**

Commencez à prendre DAILY, comprimé enrobé au moins 21 à 28 jours après un accouchement. Si vous commencez après le 28<sup>e</sup> jour, vous devez utiliser une méthode dite de type barrière (par exemple, un préservatif) pendant les sept premiers jours d'utilisation de DAILY, comprimé enrobé. Toutefois, si vous avez déjà eu des rapports sexuels, vous devez vous assurer que vous n'êtes pas enceinte ou attendre vos premières règles avant de commencer à utiliser DAILY, comprimé enrobé.

*Demandez conseil à votre médecin si vous ne savez pas exactement quand démarrer votre contraception.*

**Si vous allaitez et que vous voulez (re)commencer DAILY après un accouchement, veuillez lire la rubrique « Allaitement ».**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Si vous avez pris plus de DAILY, comprimé enrobé que vous n'auriez dû :**

Aucune conséquence grave n'a été rapportée après la prise d'un trop grand nombre de comprimés de DAILY.

Le surdosage peut se manifester par des signes digestifs (nausées ou vomissements), une douleur abdominale, une tension mammaire, des étourdissements, de la somnolence/fatigue et, chez les jeunes filles, par des saignements vaginaux.

Si vous avez pris plus de comprimés de DAILY que vous n'auriez dû ou si vous découvrez qu'un enfant a pris des comprimés, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

**Si vous oubliez de prendre DAILY, comprimé enrobé :**

Si l'oubli du comprimé remonte à **moins de 12 heures**, l'efficacité contraceptive n'est pas réduite. Prenez immédiatement le comprimé oublié et continuez à prendre les comprimés suivants à l'heure habituelle.

Si l'oubli du comprimé remonte à **plus de 12 heures**, l'efficacité contraceptive peut être réduite. Plus le nombre de comprimés oubliés est élevé, plus le risque de diminution de l'efficacité contraceptive est important. Le risque d'une protection contraceptive incomplète est maximal si vous oubliez un comprimé au début ou à la fin de la plaquette. Vous devez par conséquent respecter les règles contraceptives suivantes (reportez-vous également au schéma ci-dessous) :

**Oubli de plus d'un comprimé de la plaquette en cours :**

Contactez votre médecin.

**Oubli d'un seul comprimé (plus de 12 heures de retard) de la plaquette en cours :**

o **Oubli d'un comprimé en semaine 1 :**

Prenez immédiatement le comprimé oublié, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Continuez ensuite à prendre les comprimés à l'heure habituelle et utilisez des mesures contraceptives supplémentaires, par exemple un préservatif, pendant les 7 jours suivants. Si vous avez eu des rapports sexuels dans la semaine qui a précédé l'oubli ou si vous avez oublié de commencer une nouvelle plaquette après la période sans prise de comprimés, vous devez être consciente qu'il existe un risque de grossesse. Dans ce cas, consultez votre médecin.

o **Oubli d'un comprimé en semaine 2 :**

Prenez immédiatement le comprimé oublié, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Continuez ensuite à prendre les comprimés à l'heure habituelle. L'efficacité contraceptive n'est pas réduite et vous n'avez pas besoin de prendre de précautions supplémentaires.

o **Oubli d'un comprimé en semaine 3 :**

Vous pouvez choisir l'une des deux possibilités suivantes :

- Prenez immédiatement le comprimé oublié, même si cela implique la prise de deux comprimés en même temps. Continuez ensuite à prendre les comprimés à l'heure habituelle. Au lieu de respecter un intervalle sans prise de comprimés, commencez directement la plaquette suivante.

Il est fort probable que vous ayez vos règles (hémorragie de privation) à la fin de la deuxième plaquette mais vous pouvez aussi avoir des spotting ou des saignements entre les règles pendant la prise des comprimés de la deuxième plaquette.

- Vous pouvez aussi arrêter de prendre les comprimés de la plaquette et passer directement à la période d'arrêt de 7 jours (**notez le jour de votre oubli**). Si vous voulez commencer une nouvelle plaquette le jour habituel, raccourcissez la période sans prise de comprimés à moins de 7 jours.

Si vous suivez correctement l'une de ces deux recommandations, vous resterez protégée d'une grossesse.

Si vous avez oublié un comprimé d'une plaquette et que vous n'avez pas eu d'hémorragie de privation (règles) au cours de la période sans prise de comprimés, cela peut signifier que vous êtes enceinte. Vous devez consulter votre médecin avant de commencer la plaquette suivante.

**Que faire en cas de vomissements ou de diarrhées sévères :**

Si vous vomissez dans les 3 à 4 heures qui suivent la prise d'un comprimé ou si vous avez une diarrhée sévère (très liquide), il est possible que les substances actives de la pilule ne soient pas complètement absorbées dans votre corps. La situation est similaire à celle d'un oubli de comprimé. Dans ces cas-là, vous devez prendre un autre comprimé d'une plaquette de réserve dès que possible et si possible dans les 12 heures qui suivent l'heure habituelle à laquelle vous prenez votre pilule. Si ce n'est pas possible ou si plus de 12 heures se sont écoulées, vous devez suivre les conseils donnés au paragraphe « Si vous oubliez de prendre DAILY, comprimé enrobé ».

**Si vous arrêtez de prendre DAILY, comprimé enrobé :**

Vous pouvez arrêter de prendre DAILY quand vous le souhaitez. Si vous ne souhaitez pas être enceinte, demandez à votre médecin de vous conseiller d'autres méthodes contraceptives fiables.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

**4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, en particulier si l'effet est sévère et persistant, ou si vous remarquez une modification de votre état de santé qui pourrait selon vous être due à DAILY, informez-en votre médecin.

**Effets indésirables graves**

Il existe une augmentation du risque de caillots sanguins dans les veines (thrombo-embolie veineuse [TEV]) ou dans les artères (thrombo-embolie artérielle [TEA]) chez toutes les femmes qui prennent des contraceptifs hormonaux combinés. Pour plus de précisions sur les différents risques associés à la prise de contraceptifs hormonaux combinés, reportez-vous à la rubrique 2, « Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser DAILY, comprimé enrobé ? ».

**Consultez immédiatement un médecin, si vous ressentez un des effets indésirables graves indiqués ci-dessous :**

- Une réaction allergique grave
  - Les symptômes sont les suivants : respiration sifflante soudaine, difficulté respiratoire ou sensations vertigineuses, gonflement des paupières, du visage, des lèvres ou de la gorge, éruption cutanée, urticaire.
  
- Un angioœdème
  - Les symptômes sont les suivants : gonflement du visage, de la langue et/ou de la gorge et/ou des difficultés à avaler ou une urticaire avec éventuellement des difficultés à respirer (voir aussi « Avertissements et précautions »).
  
- Thrombose de la veine rétinienne
  - Les symptômes surviennent le plus souvent dans un seul œil.
  - Vision brouillée non douloureuse pouvant évoluer en perte de la vue.

- Perte soudaine de la vue.
- Syndrome hémolytique et urémique (affection du sang et des reins)
  - Les symptômes sont les suivants : vomissements, diarrhée (qui peut être sanguinolente), fièvre, sensation de faiblesse, diminution de la production d'urine.
- Pancréatite
  - Les symptômes sont une douleur grave dans le haut du ventre, pouvant s'étendre dans le dos.
- Erythème polymorphe
  - Les symptômes sont une éruption cutanée avec des taches roses ou rouges, particulièrement sur la paume des mains et la plante des pieds, avec éventuellement formation de cloques. Cela peut s'accompagner d'ulcères au niveau de la bouche, des yeux ou des organes génitaux, et de fièvre.

L'évaluation de ces effets indésirables repose sur les informations suivantes relatives à leur fréquence d'apparition :

- très fréquent : affecte plus d'une utilisatrice sur 10
- fréquent : affecte 1 à 10 utilisatrices sur 100
- peu fréquent : affecte 1 à 10 utilisatrices sur 1 000
- rare : affecte 1 à 10 utilisatrices sur 10 000
- très rare : affecte moins d'une utilisatrice sur 10 000
- non connu : la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles.

*Les effets indésirables les plus souvent rapportés (touchant plus de 10 utilisatrices sur 100) durant les essais cliniques et durant le suivi après commercialisation ont été des maux de tête, dont des migraines, et des saignements irréguliers (entre les règles).*

*Les effets indésirables fréquemment rapportés (touchant entre 1 et 10 utilisatrices sur 100) sont : vaginite, incluant candidose vaginale, modification de l'humeur incluant la dépression, modification de la libido (désir sexuel), nervosité, étourdissements, nausée, vomissement, douleur abdominale, acné, douleur, tension ou gonflement ou écoulement des seins, douleur des règles, modification des sécrétions vaginales et des règles, modification d'un ectropion (ectropion : retournement vers l'extérieur des muqueuses génitales), absence de règles, rétention d'eau, gonflement / gonflement du corps (œdème), augmentation ou diminution du poids.*

*Les effets indésirables peu fréquemment rapportés (touchant entre 1 et 10 utilisatrices sur 1 000) sont :*

Augmentation ou diminution de l'appétit, crampes abdominales, ballonnement, éruption cutanée, taches brunes sur le visage (chloasma pouvant être persistant), augmentation de la pilosité, chute de cheveux, hypertension artérielle, modification des graisses dans le sang dont une

augmentation des triglycérides.

*Les effets indésirables rarement rapportés (touchant entre 1 et 10 utilisatrices sur 10 000) sont :* réactions allergiques sévères pouvant s'accompagner d'urticaire, de gonflements, de troubles circulatoires et de difficultés respiratoires, augmentation du taux de sucre dans le sang (intolérance au glucose voire une hyperglycémie), irritation par les lentilles de contact, jaunisse, nodules sous la peau (érythème noueux),

Caillots sanguins dans une veine ou une artère, par exemple :

- dans une jambe ou un pied (thrombose veineuse profonde, TVP),
- dans un poumon (embolie pulmonaire, EP),
- dans les vaisseaux du cœur (crise cardiaque),
- dans les vaisseaux du cerveau (accident vasculaire cérébral - AVC),
- mini-AVC ou symptômes temporaires de type AVC, connus sous le nom d'accident ischémique transitoire (AIT),
- caillots sanguins dans le foie, l'estomac/l'intestin, les reins ou un œil.

Le risque d'apparition d'un caillot sanguin peut être plus élevé si vous présentez certains autres facteurs qui augmentent ce risque (voir rubrique 2 pour plus d'informations sur les facteurs augmentant le risque de caillots sanguins et les symptômes d'un caillot sanguin).

*Les effets indésirables très rarement rapportés (touchant moins de 1 utilisatrice sur 10 000) sont :*

- tumeurs malignes du foie, tumeurs bénignes du foie, aggravation d'une maladie du système immunitaire (lupus), d'une maladie du foie (la porphyrie), des varices ou d'une maladie appelée chorée caractérisée par la survenue de mouvements incontrôlables, brusques et irréguliers ;
- survenue de certains troubles au niveau des yeux tel qu'une inflammation du nerf optique qui peut conduire à une perte partielle ou totale de la vision, ou tel qu'un caillot de sang au niveau de la rétine, d'affections du foie ou du pancréas, d'une réaction cutanée particulière appelée érythème polymorphe, d'une maladie entraînant des troubles sanguins et urinaires (syndrome hémolytique urémique) ou d'une colite ischémique (flux sanguin insuffisant dans le côlon) ;
- augmentation du risque de calculs biliaires ou obstruction du flux biliaire ;
- diminution des folates dans le sang.

D'autres effets indésirables dont la fréquence n'a pas été déterminée ont été rapportés : tels que troubles hépatiques (fonction du foie) ou maladies inflammatoires du côlon (maladie de Crohn, colite ulcéreuse) ou aggravation des symptômes d'un angio-œdème (gonflement rapide d'une partie du corps) héréditaire ou acquis.

### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé

(ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:  
<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER DAILY, comprimé enrobé ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP.  
La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

##### Ce que contient DAILY, comprimé enrobé

- Les substances actives sont :

##### 6 comprimés roses :

Lévonorgestrel (DCI) micronisé 0,050 mg

Ethinylestradiol (DCI) micronisé 0,030 mg

Pour un comprimé enrobé.

##### 5 comprimés blancs :

Lévonorgestrel (DCI) micronisé 0,075 mg

Ethinylestradiol (DCI) micronisé 0,040 mg

Pour un comprimé enrobé.

##### 10 comprimés jaunes :

Lévonorgestrel (DCI) micronisé 0,125 mg

Ethinylestradiol (DCI) micronisé 0,030 mg

Pour un comprimé enrobé.

- Les autres composants sont :

Comprimés roses : Silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, talc, amidon de maïs, lactose monohydraté.

Composition de l'enrobage : povidone, macrogol 6000, copovidone, carbonate de calcium, saccharose, talc, silice colloïdale anhydre, carmellose sodique, oxyde de fer rouge (E172), dioxyde de titane (E171).

Comprimés blancs : Silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, talc, amidon de maïs, lactose monohydraté.

Composition de l'enrobage : povidone, macrogol 6000, copovidone, carbonate de calcium, saccharose, talc, silice colloïdale anhydre, carmellose sodique, dioxyde de titane (E171).

Comprimés jaunes : Silice colloïdale anhydre, stéarate de magnésium, talc, amidon de maïs, lactose monohydraté.

Composition de l'enrobage : povidone, macrogol 6000, copovidone, carbonate de calcium, saccharose, talc, silice colloïdale anhydre, carmellose sodique, oxyde de fer jaune (E172),

dioxyde de titane (E171).

### **Qu'est-ce que DAILY, comprimé enrobé et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous forme de comprimés enrobés.

Boîtes de 1 ou 3 plaquettes de 21 comprimés.

### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**

LES CAUQUILLOUS

81500 LAVAUUR

### **Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT**

PARC INDUSTRIEL DE LA CHARTREUSE

81100 CASTRES

### **Fabricant**

**PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION**

SITE PROGIPHARM

RUE DU LYCEE

45500 GIEN

ou

**GEDEON RICHTER PLC.**

GYÖMRÖI ÚT 19-21

1103 BUDAPEST

HONGRIE

### **Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

### **La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

{MM/AAAA}> {mois AAAA}.>

### **Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).