

**Dénomination du médicament**

NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon

Chlorure de cétylpyridinium

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien . Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?
3. Comment utiliser NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

Classe pharmacothérapeutique ? Code ATC : S01XA

Ce médicament est un collyre (gouttes oculaires) contenant un antiseptique.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon?**

**N'utilisez jamais NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon :**

- Si vous êtes allergique à certains antiseptiques (ammonium quaternaires), à la substance active ou à l'un des composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon.

- En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil), consulter votre médecin.
- L'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez qui le risque d'intolérance locale est majoré.
- Respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.
- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.
- Refermer celui-ci soigneusement après usage.
- En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

### **Autres médicaments et NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon**

En cas de traitement concomitant par un collyre contenant une substance active différente, espacer de 15 minutes les instillations.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

### **Grossesse et allaitement**

Ce médicament doit être utilisé avec prudence pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Immédiatement après utilisation, il se peut que votre vision soit troublée.

Faites attention si vous conduisez des véhicules ou si vous utilisez des machines.

## **3. COMMENT UTILISER NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?**

En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre pharmacien ou infirmière en cas de doute.

**Si vous avez utilisé plus de NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon que vous n'auriez dû**

En cas de surdosage, rincer au sérum physiologique stérile.

## 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Irritation locale.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

[www.signalement-sante.gouv.fr](http://www.signalement-sante.gouv.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le conditionnement extérieur.

Ce médicament ne doit pas être conservé plus de 15 jours après ouverture du flacon.

Notez la date de première utilisation en clair sur l'emballage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

**Ce que contient NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon**

- La substance active est :

Chlorure de cétalpyridinium ..... 2,500 mg  
Pour un flacon de 10 ml.

- Les autres composants sont : Hydrogénophosphate de sodium anhydre, hydrogénophosphate de potassium, eau purifiée.

**Qu'est-ce que NOVOPTINE 2,5 mg/10 ml, collyre en flacon et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous la forme d'un collyre en flacon de 10 ml.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**SIFI S.P.A.**

VIA ERCOLE PATTI, 36  
95025 ACI S. ANTONIO (CT)  
ITALIE

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**SIFI FRANCE SAS**

8 RUE DES GRANDES TERRES  
92500 RUEIL MALMAISON

**Fabricant**

**EXCELVISION**

RUE DE LA LOMBARDIERE  
07100 ANNONAY

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

< {MM/AAAA}>< {mois AAAA}.>

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).