

**Dénomination du médicament**

**PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale**  
**Chlorhydrate de pramocaïne**

**Encadré**

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce que PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ?
3. Comment utiliser PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

**1. QU'EST-CE QUE PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : anesthésique local - code ATC : D04AB07

Ce médicament contient un anesthésique local.

Il est préconisé dans certaines pathologies anales s'accompagnant de douleurs ou démangeaisons, en particulier dans la crise hémorroïdaire.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ?**

### **N'utilisez jamais PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale :**

- si vous êtes allergique à la pramocaïne, aux anesthésiques locaux ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- en cas d'examens endoscopiques par voie orale.

N'appliquez pas sur le nez ou les yeux.

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1 %, gel pour application locale.

L'administration de ce produit ne dispense pas du traitement spécifique des autres maladies anales.

Le traitement doit être de courte durée. Si les symptômes ne cèdent pas rapidement, il est indispensable de consulter votre médecin.

### **Enfants et adolescents**

Sans objet.

### **Autres médicaments et PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

### **PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Dans l'espèce humaine, aucun effet malformatif n'a été rapporté suite à la prise d'anesthésiques locaux. Toutefois, l'administration d'anesthésiques locaux peut par voie péridurale entraîner des effets néfastes chez la femme enceinte et le nouveau-né. En conséquence, l'usage est déconseillé par prudence au cours de la grossesse et l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

### **PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale contient du propylène glycol (E1520)**

Ce médicament contient 6 g de propylène glycol (E1520) par tube de 30 g. Le propylène glycol (E1520) peut causer une irritation cutanée.

## **3. COMMENT UTILISER PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 application matin et soir sur la région douloureuse.

Voie rectale.

En application locale ou avec une compresse.

Le traitement doit être de courte durée.

**Si vous avez utilisé plus de PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale que vous n'auriez dû**

En cas d'ingestion accidentelle de PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL par voie orale des nausées, vomissements, diarrhée, somnolence peuvent apparaître. Dans ce cas, veuillez contacter votre médecin.

**Si vous oubliez d'utiliser PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

**Si vous arrêtez d'utiliser PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

- Possibilité d'allergie, d'irritation.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

##### **Ce que contient PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale**

- La substance active est :

Chlorhydrate de pramocaïne..... 1  
g

Pour 100 g de gel.

- Les autres composants sont : propylèneglycol (E1520), hypromellose, eau purifiée.

**Qu'est-ce que PRAMOCAINE CHLORHYDRATE ARROW CONSEIL 1%, gel pour application locale et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament est un gel pour application locale.

Il se présente en tube de 30 g de gel.

Boîte de 1 tube avec canule.

**Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

**ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**ARROW GENERIQUES**

26 AVENUE TONY GARNIER

69007 LYON

**Fabricant**

**BENTA LYON**

29 avenue Charles de Gaulle

69230 SAINT GENIS LAVAL

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).