

Dénomination du médicament

PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable
Méquitazine

Encadré

- Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ?
3. Comment prendre PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmacothérapeutique - ANTIHISTAMINIQUE À USAGE SYSTÉMIQUE code ATC : R06AD07.

PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable contient une substance active, la méquitazine, qui appartient à la famille de médicaments appelée antihistaminiques H1. La méquitazine s'oppose aux effets de certaines substances (histamine) libérées dans l'organisme au cours de l'allergie. Ce médicament est réservé à l'adulte.

PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable est utilisé pour traiter les symptômes de la rhinite allergique, de la conjonctivite allergique et/ou de l'urticaire :

- La rhinite allergique est une inflammation du nez entraînant une sensation de nez bouché (sensation d'obstruction nasale), une irritation du nez, un écoulement nasal clair et des éternuements. Elle peut être saisonnière c'est-à-dire survenir à certaines périodes de l'année (exemple : rhume des foins) ou perannuelle, c'est-à-dire survenir en cas d'exposition à certains éléments déclenchants (par exemple poussière, poils d'animaux, acariens...) à n'importe quel moment de l'année.

- La conjonctivite allergique est une inflammation de conjonctive de l'œil (membrane recouvrant le blanc de l'œil et le dessous des paupières) entraînant, des yeux rouges, irrités et qui démangent et des larmoiements.

- L'urticaire est une forme de réaction allergique cutanée avec apparition de plaques rouges sur la peau qui démangent (ressemblant à une piqûre d'orties).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ?

Ne prenez jamais PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable :

- si vous êtes allergique à la substance active (méquitazine) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6,
- si vous allaitez votre enfant,
- si vous présentez ou suspectez un allongement de l'intervalle QT (ou syndrome du QT long congénital ou acquis) qui est une anomalie au niveau du cœur détecté lors de la réalisation d'un électrocardiogramme (ECG) par le médecin,
- si vous avez un faible taux de potassium dans le sang (hypokaliémie),
- si vous avez un ralentissement du rythme des battements cardiaques (bradycardie),
- si vous avez ou avez déjà eu une diminution importante du taux de certains globules blancs (granulocytes) dans le sang (agranulocytose),
- si vous avez un risque de glaucome à angle fermé (pression élevée à l'intérieur de l'œil détectée lors d'un examen par l'ophtalmologue),
- si vous avez des difficultés pour uriner,
- si vous prenez certains médicaments pouvant provoquer de troubles du rythme cardiaque (voir rubrique ci-dessous « Autres médicaments et PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable.

Avant de commencer le traitement

Prévenez votre médecin ou votre pharmacien :

- si vous avez une maladie grave du foie (insuffisance hépatique sévère),
- si vous êtes épileptique (convulsions),
- si vous êtes âgé(e) de plus de 65 ans (notamment en raison du risque augmenté de somnolence, d'hallucination, de confusion mentale et de constipation chez les sujets âgés),
- si vous avez des difficultés à uriner.

Pendant le traitement

Il est préférable de ne pas vous exposer au soleil car ce médicament peut provoquer une réaction exagérée de la peau après exposition au soleil et aux UV (photosensibilisation).

Prévenez immédiatement votre médecin et arrêtez de prendre PRIMALAN :

- si vous ressentez des palpitations, des battements irréguliers du cœur, une accélération importante du rythme des battements cardiaques (tachycardie) ou si vous avez un malaise avec sensation de perte de connaissance. Le médecin vous demandera éventuellement de faire réaliser un électrocardiogramme (également appelé ECG) qui est un examen mesurant l'activité électrique du cœur et qui enregistre les battements cardiaques,
- si vous avez de la fièvre accompagnée ou non de signes d'infection survenant en cours de traitement par ce médicament. Cela peut être le signe d'une diminution induite par le médicament du taux sanguin de globules blancs (granulocytes) qui sont importants dans la lutte contre les infections.

Si des symptômes d'allergie persistent ou s'aggravent, n'augmentez pas la dose mais **CONSULTEZ VOTRE MEDECIN.**

La prise de ce médicament est déconseillée avec des boissons alcoolisées et des médicaments contenant de l'alcool (voir rubrique « PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable avec l'alcool »).

La prise de ce médicament est déconseillée avec la prise de certains autres médicaments (voir rubrique « Autres médicaments et PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable »).

Autres médicaments et PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Ce médicament contient de la méquitazine (antihistaminique). D'autres médicaments contiennent de la méquitazine ou un autre antihistaminique. Ne les associez pas à votre traitement en cours, afin de ne pas dépasser la dose maximale recommandée (voir paragraphe "Comment prendre PRIMALAN"). Si vous devez prendre d'autres médicaments contenant cette substance ou un autre antihistaminique, vous devez d'abord demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Vous ne devez jamais prendre PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable en même temps que certains médicaments pouvant donner des troubles graves du rythme cardiaque tels que :

- certains médicaments destinés à traiter les troubles du rythme cardiaque (quinidine, hydroquinidine, disopyramide, amiodarone, sotalol, la dronédarone),
- certains antiparasitaires : artémimol (ou dihydroartémisinine), pipéraquline,
- certains antibiotiques : érythromycine administrée directement dans le sang (voie intraveineuse), spiramycine, moxifloxacine,
- certains vasodilatateurs (vincamine administrée directement dans le sang (voie intraveineuse)),
- certains médicaments utilisés pour traiter les nausées et les vomissements (dompéridone),
- certains médicaments utilisés dans le traitement des cancers (vantédanib, torémifène),
- certains antidépresseurs (citalopram, escitalopram, hydroxyzine),
- d'autres médicaments antihistaminiques (mizolastine).

Sauf avis contraire de votre médecin , vous ne devez pas prendre PRIMALAN en même temps que :

- certains médicaments pour traiter une infection parasitaire (chloroquine, halofantrine, luméfántrine, pentamidine),
- certains médicaments destinés à traiter les troubles psychiatriques (amisulpride, chlorpromazine, cyamémazine, dropéridol, flupentixol, fluphénazine, halopéridol, lévomépromazine, pimozide, pipampérone, pipotiazine, sulpiride, tiapride, zuclopenthixol),
- la méthadone (médicament pour lutter contre la dépendance aux drogues),
- certains médicaments pour traiter certaines dépressions (paroxétine, fluoxétine, duloxétine),
- le bupropion (médicament qui aide à arrêter de fumer),
- les médicaments dérivés de l'arsenic pouvant être prescrits en homéopathie (arsénieux),
- certains médicaments utilisés pour traiter un mauvais fonctionnement des glandes parathyroïdes qui sont les petites glandes situées près de la thyroïde au niveau du cou (cinacalcet),
- certains médicaments pour traiter une infection par des champignons (terbinafine),
- certains médicaments pour le traitement de la narcolepsie qui est un trouble rare et grave du sommeil (oxybate de sodium) en raison du risque d'altération de la vigilance en cas de conduite de véhicule ou d'utilisation de machine,

- certains médicaments pour traiter certaines maladies rhumatismales ou le lupus (hydroxychloroquine),
- certains antibiotiques (cotrimoxazole – sulfaméthoxazole + triméthoprime),
- certains médicaments utilisés dans le traitement du cancer du poumon (crizotinib),
- certains médicaments utilisés dans le traitement de la tuberculose (delamanid).

Contactez votre médecin si vous prenez :

- des médicaments qui diminuent la quantité de potassium dans le sang (tels que certains diurétiques et laxatifs),
- certains médicaments destinés à traiter l'hypertension et les médicaments qui ralentissent la fréquence cardiaque,
- certains médicaments antibiotiques,
- des anxiolytiques et des antipsychotiques,
- certains antidépresseurs,
- des somnifères,
- des dérivés de la morphine,
- certains médicaments destinés à traiter la maladie de Parkinson,
- certains médicaments pour traiter la maladie Alzheimer et contre la myasthénie (maladie neuro-musculaire),
- certains antispasmodiques,
- certains médicaments pour traiter les nausées et vomissements,
- un médicament qui interfère avec le développement des plaquettes sanguines (Anagrélide),
- un traitement contre la maladie du sang appelée leucémie (Glasdégib),
- des médicaments provoquant une baisse des hormones sexuelles males,
- le médicament contenant de la thalidomide, qui est utilisé en association avec d'autres médicaments pour le traitement de myélomes (type de cancer),
- les médicaments contenant du baclofène, relaxant musculaire indiqué pour réduire les contractions musculaires involontaires et relâcher la tension excessive des muscles

(spasmes). Il est aussi indiqué pour réduire la dépendance à l'alcool.

PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable avec de l'alcool

Vous devez éviter de consommer des boissons alcoolisées pendant toute la durée du traitement.

Grossesse, allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse, ni chez les femmes en âge de procréer n'utilisant pas de contraception.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez rapidement votre médecin, lui seul pourra adapter le traitement en fonction de votre état.

En fin de grossesse, la prise abusive de ce médicament (doses dépassant celles recommandées ou durée de traitement trop longue) peut entraîner des effets néfastes chez le nouveau-né. Par conséquent, il convient de toujours demander l'avis de votre médecin avant de l'utiliser et de ne jamais dépasser la dose et la durée de traitement préconisées.

Allaitement

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Les patients doivent être informés, en particulier les conducteurs de véhicules et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence associés à la prise de ce médicament, surtout en début de traitement.

Le risque de somnolence est augmenté si vous consommez des boissons alcoolisées ou des médicaments contenant de l'alcool.

PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable contient

- du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament,
- moins de 1 mmol de sodium (23 mg) par comprimé, c'est-à-dire essentiellement « sans sodium ».

3. COMMENT PRENDRE PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

STRICTEMENT RESERVE A L'ADULTE.

La dose recommandée est de :

- Adultes : 10 mg par jour en 1 ou 2 prises,
 - o soit : ½ comprimé matin et soir ou 1 comprimé le soir.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent, n'augmentez pas les doses mais consultez votre médecin.

Cette forme, comprimé à 10 mg n'est pas adaptée à l'enfant. PRIMALAN 10 mg ne doit pas être administré aux enfants.

Mode et voie d'administration

Ce médicament est à prendre par voie orale.

Les comprimés sont à avaler avec un verre d'eau.

Les comprimés sont sécables, c'est-à-dire que vous pouvez les couper en 2 parts égales si nécessaire.

Fréquence d'administration

Il peut être souhaitable de prendre ce médicament plutôt le soir car ce médicament peut provoquer des somnolences chez certaines personnes plus sensibles (personnes âgées).

Durée du traitement

- Votre médecin vous dira pendant combien de temps vous devrez prendre ce médicament.
- Ne poursuivez pas le traitement au bout de 10 jours de traitement sans l'avis de votre médecin.

Si vous avez pris plus de PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable que vous n'auriez dû

Consultez immédiatement un médecin.

Un risque de trouble du rythme cardiaque, de convulsion, trouble de la conscience pouvant aller jusqu'au coma peuvent survenir en cas de surdosage.

Le risque d'anomalies du rythme cardiaque peut être plus important en augmentant la dose de ce médicament.

C'est pourquoi vous devez respecter la dose indiquée par votre médecin.

Si vous oubliez de prendre PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants sont de fréquence indéterminée (fréquence de survenue ne pouvant être estimée à partir des données disponibles) :

Arrêtez le traitement et consultez immédiatement un médecin si vous présentez l'un des effets indésirables suivants après avoir pris ce médicament :

- des signes d'allergie au médicament tels que :
 - o des rougeurs sur la peau (érythème), de l'eczéma, des démangeaisons (prurit), des taches pourpres sur la peau (purpura), une urticaire (éruption cutanée avec sensation

de brûlure et de démangeaison ressemblant à une piqûre d'ortie),

o l'apparition brutale de gonflement au niveau du visage, de la langue et/ou de la gorge, des bras et/ou des jambes, (angioœdème) qui au niveau de la bouche ou de la gorge peuvent gêner la respiration. Une intervention médicale peut être nécessaire en urgence,

o un choc anaphylactique : réaction allergique généralisée soudaine au cours de laquelle peuvent apparaître une éruption cutanée (telle que l'urticaire), des démangeaisons, un gonflement, des difficultés à respirer, une accélération du rythme cardiaque, des étourdissements, des sueurs, une chute de la tension artérielle et/ou une perte de conscience/évanouissement. Une intervention médicale est nécessaire en urgence,

- une réaction exagérée de la peau après exposition au soleil et aux UV (réaction de photosensibilisation),
- des problèmes cardiaques : accélération du rythme du cœur (tachycardie),
- malaise avec perte de connaissance pouvant être lié à un trouble du rythme cardiaque induit par le médicament (voir « Mises en garde spéciales »).

Si l'un des effets indésirables ci-dessous survient, contactez votre médecin dès que possible ::

- somnolence, sédation, baisse de la vigilance, plus marquées en début de traitement,
- confusion mentale, hallucinations (en particulier chez les sujets âgés),
- agitation, nervosité,
- difficultés à dormir (insomnie),
- bouche sèche,
- troubles de la vue (trouble de l'accommodation), élargissement de la pupille (mydriase),
- difficultés à uriner,
- constipation,
- difficultés à contrôler ses mouvements (dyskinésie),
- tremblements,
- troubles associant des contractions musculaires, des tremblements et/ou des mouvements anormaux des bras et/ou jambes ou du corps (troubles extrapyramidaux).

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : <https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage après EXP {MM/AAAA}. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 30 C et dans l'emballage d'origine.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable

- La substance active est :

..... Méquitazine 10 mg
Pour un comprimé sécable.

- Les autres composants sont :

Le lactose monohydraté*, l'amidon de maïs, la gomme arabique, la silice colloïdale anhydre, le talc, le carboxyméthylamidon sodique (type A)* et le stéarate de magnésium (*voir rubrique 2).

Qu'est-ce que PRIMALAN 10 mg, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur

Aspect de PRIMALAN et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable de couleur blanc crème, en forme de tige de 11 mm de hauteur et 5 mm de profondeur.

Chaque boîte contient 7, 14, 70 ou 140 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

PIERRE FABRE MEDICAMENT
LES CAUQUILLOUS
81500 LAVAUUR
FRANCE

Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

PIERRE FABRE MEDICAMENT

PARC INDUSTRIEL DE LA CHARTREUSE
81100 CASTRES
FRANCE

Fabricant

PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION
SITE PROGIPHARM
RUE DU LYCEE
45500 GIEN
FRANCE

Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

Autres

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).