

Dénomination du médicament

**SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution**  
**Bromure de céthexonium**

Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 15 jours.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?
3. Comment utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## **1. QU'EST-CE QUE SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?**

Classe pharmacothérapeutique : ANTISEPTIQUE LOCAL (S = organe des sens) - code ATC : S01AX

Traitement antiseptique des affections superficielles de l'œil et de ses annexes.

## **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?**

**N'utilisez jamais SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution :**

- si vous êtes allergique à certains antiseptiques (ammoniums quaternaires).

### **Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution.

Utiliser ce médicament avec précaution :

- ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon,
- l'utilisation de ce collyre doit être évitée chez les porteurs de lentilles de contact chez lesquels le risque d'intolérance locale est majoré,
- respecter la posologie préconisée et ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours, refermer le flacon soigneusement après usage,
- en cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre au minimum 15 minutes entre chaque instillation.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

### **Enfants**

#### **Autres médicaments et SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament, afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments notamment avec les autres antiseptiques oculaires.

#### **SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution avec des aliments et boissons et de l'alcool**

Sans objet.

### **Grossesse et allaitement**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce collyre.

Ce médicament, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Une gêne visuelle passagère peut être ressentie après instillation. Dans ce cas il est conseillé de ne pas conduire ou d'utiliser de machines jusqu'à ce que la vision redevienne normale.

**SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution contient du chlorure de sodium et de l'eau pour préparations injectables.**

### **3. COMMENT UTILISER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour.

Voie locale.

#### **EN INSTILLATION OCULAIRE**

En regardant vers le haut et en tirant la paupière inférieure légèrement vers le bas, instiller 1 goutte dans l'œil 3 à 4 fois par jour pendant 7 jours.

UTILISATION DU FLACON : Visser à fond le bouchon afin de percer l'embout du flacon.

Après usage, refermer le flacon et le remettre dans sa boîte.

Attention, ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.

DURÉE DU TRAITEMENT : En moyenne 7 jours. Ne pas prolonger le traitement au-delà de 15 jours.

**Si vous avez utilisé plus de SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution que vous n'auriez dû**

Rincer au sérum physiologique stérile.

**Si vous oubliez d'utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution**

Sans objet.

**Si vous arrêtez d'utiliser SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Une réaction d'intolérance locale est possible. En cas d'apparition de symptômes anormaux (rougeur et/ou douleur de l'œil) arrêtez le traitement et consultez votre médecin.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet :

<https://signalement.social-sante.gouv.fr>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

## 5. COMMENT CONSERVER SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon EXP.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

## 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

### Ce que contient SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution

- La substance active est :

Bromure de céthexonium..... 0,025  
g

Pour 100 mL.

- Les autres composants sont : chlorure de sodium et eau pour préparations injectables.

### Qu'est-ce que SEDACOLLYRE CETHEXONIUM 0,25 pour mille, collyre en solution et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de collyre en flacon de 10 mL.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

**COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE**  
PLACE LUCIEN AUVERT  
77020 MELUN CEDEX

### Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

**COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE FRANÇAISE**  
PLACE LUCIEN AUVERT  
77020 MELUN CEDEX

### Fabricant

**EXCELVISION**  
RUE DE LA LOMBARDIÈRE  
07100 ANNONAY

### Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

## **Autres**

Sans objet.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).