

## 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

**ARGENTUM COMPLEXE N°98, comprimé sublingual**

## 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

ARGENTUM NITRICUM	4DH	0,075 g
BISMUTHUM SUBNITRICUM	8DH	0,075 g
ATROPINUM SULFURICUM	5DH	0,075 g

Pour un comprimé sublingual de 0,25 g.

Excipient: Lactose

Pour la liste complète des excipients, [voir rubrique 6.1](#).

## 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé sublingual.

## 4. DONNEES CLINIQUES

### 4.1. Indications thérapeutiques

Médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans les brûlures d'estomac et les remontées acides.

### 4.2. Posologie et mode d'administration

Adultes: 2 comprimés, 2 à 3 fois par jour

Enfants de plus de 6 ans: 1 comprimé, 2 à 3 fois par jour

Comprimé à croquer et à laisser fondre sous la langue, à distance des repas.

Voie sublinguale.

Durée maximale de traitement: 2 semaines.

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

### 4.3. Contre-indications

En raison du risque de fausse route, la forme comprimé est contre-indiquée chez l'enfant de moins 6 ans.

### 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Médicament réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans.

Ce médicament contient du lactose. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

#### **4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions**

Sans objet

#### **4.6. Grossesse et allaitement**

L'absence de données expérimentales et cliniques et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse.

#### **4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines**

Sans objet

#### **4.8. Effets indésirables**

Sans objet

#### **4.9. Surdosage**

Sans objet

### **5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES**

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

En l'absence de données scientifiques, l'indication de ce médicament repose sur l'usage homéopathique traditionnel des préparations qui le composent.

#### **5.2. Propriétés pharmacocinétiques**

Sans objet.

#### **5.3. Données de sécurité préclinique**

Sans objet

### **6. DONNEES PHARMACEUTIQUES**

#### **6.1. Liste des excipients**

Stéarate de magnésium, amidon de riz, lactose.

#### **6.2. Incompatibilités**

Sans objet

#### **6.3. Durée de conservation**

3 ans.

#### **6.4. Précautions particulières de conservation**

Sans objet

#### **6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur**

Comprimé sublingual sous plaquettes thermoformées (PVC/Aluminium).  
Boîte de 60.

#### **6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation**

Sans objet

#### **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

**Laboratoires LEHNING**

3, rue du Petit Marais  
57640 Sainte Barbe

#### **8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE**

- 395 230-4 ou 34009 395 230 4 0: boîte de 60 comprimés sublinguaux.

#### **9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION**

[à compléter par le titulaire]

#### **10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

[à compléter par le titulaire]

#### **11. DOSIMETRIE**

Sans objet.

#### **12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES**

Sans objet.

### **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE**

Médicament non soumis à prescription médicale.